




Las fotografías se han tomado durante siete días del final de noviembre, justo antes que empiece la época de lluvias, por lo que aun queda mucho por encontrar.

Imágenes y textos: © Mauricio Pacheco Suarez
<http://entrependedientes.com>
 Excepto L. bolivianus (2da imagen): © Oscar Gavira

Muchas gracias a Steffen Reichle e Ignacio de la Riva por su ayuda con la identificación de las especies.

ACTIVIDAD. Nocturna Diurna

HABITAT. Árboles/dosel Arbustos/pasturas Suelo/hojarasca

Ecology Lodge
MADIDI JUNGLE
<http://www.madidijungle.com/>



RANAS DEL MADIDI JUNGLE ECOLOGUE

GUÍA DE BOLSILLO

RANAS DEL MADIDI JUNGLE ECOLOGUE

MAURICIO PACHECO SUAREZ



GUÍA DE BOLSILLO



Rhaebo guttatus. Sapo grande, especialmente común en torno al albergue. Su principal característica distintiva es la piel lisa del dorso y los flancos.



Rhinella major. Un sapo poco común, pero que puede encontrarse con facilidad en torno al albergue. Similar a *Rhinella marina*, pero más pequeño.



Rhinella marina. Es el sapo de mayor tamaño, llegando a medir en algunos casos más de 20 cm. Muy común, aun que es más frecuente encontrar los pequeños juveniles en la hojarasca que los adultos.



Rhinella cf. margaritifera. Poco común en el área. Se lo encuentra en la hojarasca del suelo donde se camufla gracias a su característica forma similar a una hoja. Las hembras adultas pueden tener grandes crestas.



Oreobates cf. cruralis. Parte de un complejo de especies, esta pequeña y variable rana es un habitante común de la hojarasca.



Pristimantis fenestratus. Muy común en todas partes, desde la hojarasca a las orillas de los ríos, y alrededor del albergue. Los machos cantan día y noche desde el suelo, o trepados en arbustos.



Pristimantis reichlei. Poco común, pero probablemente pasa desapercibida. Más arborícola que otras ranas del género en la zona, aun que todos los pristimantis se parecen mucho externamente.



Pristimantis sp. Encontrada sólo una vez cerca de un charco permanente, esta rana no ha sido identificada satisfactoriamente aun, y es posible que se trate de una especie no descrita. Es similar a *Pristimantis toftae*, otra rana amazónica poco conocida.



Ameerega picta. Muy común en el área, incluso entre las cabanitas del albergue. Los machos cantan todo el año desde sitios protegidos de la hojarasca, especialmente en la mañana y al final de la tarde.



Boana boans. La más grande de las ranas arborícolas en el área. Habitante del dosel, baja en la época de lluvia a reproducirse en pozas permanentes, arroyos y pequeños ríos.



Boana geographica. Muy común. Cantan en grandes números desde árboles y arbustos desde el final de la tarde.



Boana lanciformis. Gran rana arborícola, con un canto muy distintivo. Se la encuentra normalmente en árboles y arbustos a la orilla de pequeños arroyos.



Boana steinhatchi. Endémica de Bolivia, esta rana antes conocida como *Hypsiboas fasciatus* era parte de un complejo de especies recientemente resuelto. Se la encuentra percheda en árboles pequeños, y es notablemente más común al otro lado del río Tuichi.



Dendropsophus acrotratus. Pequeña habitante de la hierba y arbustos en torno a pozas permanentes y temporales. Todas las especies de este género son más fáciles de encontrar durante la época de lluvias.



100 mm



Osteocephalus taurinus. Una rana muy grande, común tanto en el bosque, como cerca de pozas y charcas grandes, e incluso dentro del lodge. Tiene un iris con un patrón de colores muy característico.



40 mm

Scinax cf. ebiquitatus. Se le encuentra percheda en arbustos y pequeños árboles en el bosque, y en torno a charcos y pozas donde se congregan en grandes números durante la época de lluvias.



45 mm

Scinax ruber. De reproducción explosiva. Se encuentran por cientos en sitios inundados durante la época de lluvias. En otros momentos, se pueden encontrar ejemplares solitarios en el bosque e incluso dentro del albergue.



37 mm



Engystomops freibergi. Muy común en el área, esta pequeña rana puede encontrarse durante el día y la noche en la hojarasca, y entre las piedras de pequeños arroyos forestados.



82 mm



Leptodactylus bolivianus. La mayor de varias especies muy similares que pueden encontrarse en el área. Poco común, pero puede encontrarse con mayor facilidad cerca del albergue, y en pequeños arroyos. Esta rana ha sido tradicionalmente confundida con *Leptodactylus labyrinthicus*.



55 mm

Leptodactylus didymus. Similar a *Leptodactylus bolivianus*, pero de menor tamaño y más asociada con charcos temporales y permanentes.



48 mm

Leptodactylus fuscus. Poco común en el área. Normalmente se encuentran en terreno inundado y sitios degradados, durante la época de lluvias.



97 mm

Leptodactylus knudseni. Se encuentran típicamente al pie de grandes árboles de ceiba, cerca de la entrada de madrigueras que excavan entre las raíces.



44 mm

Leptodactylus leptoactylus. Común localmente. Se le encuentra escondido en el barro en sitios protegidos cerca de pozas y charcos, o en bordes de bosque.



82 mm

Leptodactylus rhodonotus. Poco común en hábitat no alterado. Es encuentra en zonas de pie de monte, a la orilla de pequeños arroyos, charcas y lagunas.



32 mm

Leptodactylus sp. Rana pequeña, no identificada, pero que forma parte de un complejo de especies conocido como *Leptodactylus wagneri-podicipinus*, un grupo de ranas muy similares externamente y muy difíciles de diferenciar. Poco común en la hojarasca de bordes de bosque.



60 mm



Lithodites lineatus. Poco común en la hojarasca en torno al albergue. Asociada a los nidos de hormigas cortadoras de hojas, dentro de los cuales encuentran refugio e incluso se reproducen cuando estos se inundan.



43 mm

Hampophryne boliviana. Una habitante típica de la hojarasca de bosque primario, se le encuentra regularmente en los senderos en torno al albergue.



55 mm

Callimedusa tonopterna. Poco común en torno a pozas permanentes y lagunas, y en ciertos casos, cerca de solitarios.



75 mm



Cruziohylla cnuspedopus. Una rana raras veces vista, que habita el dosel y desciendo únicamente para depositar sus huevos en cavidades de troncos y pozas temporales. Su hallazgo en 2017, en un sitio cercano al albergue, representa el primer registro de la especie en Bolivia.



49 mm

Pithecopus palliatus. Poco común. Únicamente hallada cerca de un área inundada cercana al albergue, pero típica de pozas y lagunas con abundante vegetación en las orillas.



84 mm

Phyllomedusa camba. Común cerca pozas y charcos permanentes y temporales, aun que se le ha encontrado en bosque. Los machos cantan desde árboles a media altura.



83 mm



Phyllomedusa vaillanti. Común en bosque a orillas de pequeños arroyos, lagunas y grandes pozas permanentes. Se le distingue fácilmente por las líneas de tubérculos blancos en la espalda.

FROGS OF THE MADIDI JUNGLE ECOLOGUE

NEST-BUILDING FROGS